



PLETISMOGRAFIA - Resistência e Volumes Pulmonares

Orientações para o exame

- Interromper o uso dos medicamentos broncodilatadores de ação prolongada por pelo menos 12 horas (se possível, por 24 horas) antes do exame.

- são broncodilatadores de ação prolongada: symbicort, alenia, foraseq, vannair, seretide, fostair, relvar, fluir, formocaps, onbrize, seebri, striverdi, spiriva, spiolto, ultibro, vanisto, teolong, aminofilina, bamifex.

- Interromper o uso de broncodilatadores de curta ação por 4 horas antes do exame.

- são broncodilatadores de ação curta: berotec (fenoterol), atrovent (ipratrópio), aerodini, aerolin, salbutamol, duovent.

- Outros medicamentos devem ser tomados normalmente.

- Não fumar por pelo menos 2 horas antes do exame. O horário do último cigarro fumado deverá ser informado, se for o caso.

- O exame só poderá ser realizado após 1 hora da última refeição e/ou da última atividade física.

- Não ingerir bebida alcoólica por pelo menos 8 horas antes do exame.

- Não ingerir cafeinados em geral como café puro, chá mate, chocolate, refrigerante a base de cola (refrigerante de cor preta) por pelo menos 6 horas antes do exame.

- Informar se fizer uso de oxigenoterapia domiciliar e, nestes casos, o mesmo será suspenso pelo menos 5 (cinco) minutos antes do exame.